

## GUÍA DE VALPROATO PARA PACIENTES MASCULINOS EN EDAD REPRODUCTIVA

Lea esta guía junto con el folleto de información para el paciente para obtener información completa del producto

# Ácido valproico (Depakene<sup>®</sup>), Valproato semisódico (Epival<sup>®</sup>) QUE DEBERÍA SABER

Esta guía contiene información clave sobre el riesgo potencial al engendrar un hijo si usted está en tratamiento con valproato. Consulte a su médico o farmacéutico si tiene alguna pregunta.

**CONSERVE ESTA GUÍA. ES POSIBLE QUE TENGA QUE VOLVER A LEERLA.**

## ¿Cuáles son los riesgos de tomar valproato al engendrar un hijo?

Un estudio sugiere que, si toma valproato en los 3 meses previos a la concepción, su hijo puede tener un mayor riesgo de sufrir un desarrollo mental y/o motor deteriorado en comparación con los niños nacidos de padres que usaron lamotrigina o levetiracetam, otros medicamentos que pueden ser utilizado para tratar su enfermedad.

En este estudio, alrededor de 5 niños de cada 100 tenían trastornos cuando nacieron de padres tratados con valproato, y alrededor de 3 niños de cada 100 cuando nacieron de padres tratados con otros medicamentos.

No hay datos sobre este riesgo potencial para los niños concebidos más de 3 meses después de suspender el tratamiento con valproato (el tiempo necesario para que se formen nuevos espermatozoides).

### ¿Qué significa esto para mí?

Su médico discutirá con usted (y/o su padre/cuidador) el riesgo potencial de concebir un hijo si recibe tratamiento con valproato y las precauciones asociadas con el uso de valproato:

- La necesidad de utilizar un **método anticonceptivo eficaz** (control de la natalidad) para usted y su pareja femenina durante el tratamiento y al menos 3 meses después de suspender el valproato.
- La necesidad de consultar a su médico para analizar **opciones de tratamiento alternativas**, tan pronto como planea tener un hijo y antes de suspender la anticoncepción (control de la natalidad).
- **No donar espermatozoides** durante el tratamiento y al menos los 3 meses posteriores a su finalización.

---

Si su **pareja femenina queda embarazada** mientras usted usó valproato en los 3 meses previos a la concepción, ambos deben **comunicarse con el médico** para recibir asesoramiento.

**No interrumpa su tratamiento** sin hablar con su médico. Si interrumpe su tratamiento, sus síntomas pueden empeorar.

Debe **programar citas periódicas** con su médico.

---

*Si tiene conocimiento o experimenta una sospecha de reacción adversa a su medicamento puede comunicarlos directamente a través del Sistema Regional de Reporte en Línea de Sospecha de Reacciones Adversas a medicamentos y vacunas de uso humano en el siguiente enlace: [notifacedra.comisca.org](https://notifacedra.comisca.org)*

*Si tiene conocimiento o experimenta una sospecha de falla terapéutica se notificarán a través de la plataforma FADDI en el siguiente enlace: [faddi-minsa.panamadigital.gob.pa](https://faddi-minsa.panamadigital.gob.pa)*

CONSULTE EL FOLLETO DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE PARA OBTENER INFORMACIÓN MÁS DETALLADA

Effective

RDPHVigTwo008145/2

**Signature Page**

VALP aRMM Patient Guide Male v 2.0 Panama

Approver

Meaning

Date (UTC)

Sandoval Lourdes

Content Approval

05-JUN-2026 14:08:33

Approver II

Meaning

Date (UTC)

Arellano Arturo

Content Approval

05-JUN-2026 15:00:26