

Paciente (Nombre/número de identificación)	
Nombre del médico tratante de epcoritamab	
Número de teléfono del médico tratante (durante el horario de oficina)	
Número de teléfono de emergencia del médico tratante (fuera del horario de oficina)	
Información del contacto de emergencia	
Fecha de la primera dosis de epcoritamab	

Versión: julio de 2023

abbvie

▼ Tarjeta de paciente

Lleve consigo esta tarjeta en todo momento. Muéstrela a cualquier proveedor de atención médica que lo atienda y cuando vaya a consultar a cualquier hospital.

- Informe a cualquier proveedor de atención médica que lo atienda, que está recibiendo tratamiento con Epkinly™ 4mg/0.8mL Solución Inyectable o Epkinly™ 48mg/0.8mL Solución Inyectable (epcoritamab).
- Si experimenta alguna reacción adversa después del tratamiento con epcoritamab, consulte a su médico o enfermero.
- Tenga cuidado al conducir, montar en bicicleta o utilizar máquinas pesadas o potencialmente peligrosas. Si tienes alguno de los síntomas descritos en esta tarjeta, debe evitar estas actividades.

▼ Las notificaciones de sospechas de reacciones adversas de Epkinly™ deben ser comunicadas a la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas a través de las plataformas digitales habilitadas. También puedes informar las sospechas de reacciones adversas directamente al correo electrónico pvregionnorte@abbvie.com.

Información para pacientes

Epkinly™ es un medicamento contra el cáncer que contiene la sustancia activa epcoritamab y se utiliza como monoterapia para tratar a pacientes adultos que tienen un cáncer de sangre llamado linfoma B difuso de células grandes (LBDCG) cuando la enfermedad ha reaparecido o no respondió a tratamientos previos tras al menos dos terapias previas. Epcoritamab puede provocar reacciones adversas que pueden ser graves. **Llame a su médico o busque ayuda de emergencia de inmediato si tiene alguno de los siguientes síntomas:**

Síndrome de liberación de citoquinas (SLC):

- Fiebre (38°C o más)
- Mareos o aturdimiento
- Escalofríos
- Latidos cardíacos rápidos
- Dificultad para respirar
- Dolor de cabeza

Síndrome de neurotoxicidad asociada a células inmunoefectoras (ICANS).

- Dificultad para hablar o escribir
- Somnolencia
- Confusión/ desorientación
- Debilidad muscular
- Convulsiones
- Pérdida de memoria

Información para proveedores de atención médica

- Este paciente está siendo tratado con epcoritamab, un anticuerpo biespecífico que involucra a las células T.
- Tras el tratamiento con epcoritamab, puede producirse el síndrome de liberación de citoquinas (SLC) y el síndrome de neurotoxicidad asociada a células inmunoefectoras (ICANS, de sus siglas en inglés), que pueden ser graves si no se tratan con prontitud. La SLC puede aparecer varias horas o días después de la administración de epcoritamab, generalmente después de la primera dosis completa del ciclo 1. El ICANS puede producirse varios días o semanas después de la administración de epcoritamab.
- **Póngase en contacto inmediatamente con el médico tratante del paciente para obtener más información (detalles al dorso).**