

Tarjeta informativa al paciente para el uso de Metamizol y el riesgo de agranulocitosis

- ☐ El metamizol también llamado dipirona es un medicamento utilizado solo para el tratamiento del dolor agudo moderado o intenso posoperatorio o postraumático, de tipo cólico o dolor por cáncer. También se utiliza en los casos de fiebre alta que no responda a otras medidas u otros medicamentos para la fiebre.
- ☐ El metamizol se debe utilizar solo para tratamientos de corta duración (3 a 5 días), vigilando la aparición de síntomas indicativos de agranulocitosis y evitar su uso en dolor leve. En caso de tratamiento prolongado solo debe utilizarse bajo supervisión médica.
- ☐ El tratamiento con metamizol puede causar agranulocitosis, que puede ser mortal. La agranulocitosis (un recuento de los glóbulos blancos más bajo de lo normal) no depende de la dosis y puede aparecer en cualquier momento durante el tratamiento, incluso poco después de haber interrumpido el tratamiento, o si usted ha utilizado metamizol sin problemas en el pasado.
- ☐ La agranulocitosis se manifiesta con los siguientes signos y síntomas: fiebre, escalofríos, dolor de garganta, y llagas dolorosas en las mucosas especialmente en la boca, nariz y garganta o en la zona genital o anal.
- ☐ Si toma metamizol para la fiebre, algunos síntomas de la agranulocitosis pueden pasar desapercibidos. De manera similar los síntomas pueden estar enmascarados si usted está tomando antibióticos.
- ☐ Debe dejar de tomar metamizol y contactar a su médico inmediatamente en caso de presentar los síntomas indicativos de agranulocitosis.
- ☐ No tome metamizol si previamente ha tenido un descenso significativo de un tipo de glóbulos blancos llamados granulocitos, que fue causado por metamizol u otros medicamentos similares llamados pirazonas o pirazolidinas.
- ☐ Notifique las sospechas de reacciones adversas al Centro Nacional de Farmacovigilancia a través de VigiMedic Panamá <https://vigiflow-eforms.who-umc.org/pa/vigimedic>.