

Si experimenta algún efecto secundario, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero.

Esto incluye cualquier posible efecto secundario que no se describa en este prospecto.

POR FAVOR REPORTE EFECTOS SECUNDARIOS A: Abbott Centroamérica y Caribe (pv.guatemala@abbott.com)

O REPORTE A:

Centro Nacional de Farmacovigilancia, Ministerio de Salud de Panamá a través de Vigimedic Panamá Enlace: <https://vigiflow-eforms.who-umc.org/pa/vigimedic>

Al reportar los efectos secundarios, puede ayudar a proporcionar más información sobre la seguridad de denosumab (RESYNIV®).



Esta tarjeta recordatoria contiene información de seguridad importante que debe tener en cuenta antes y durante el tratamiento con denosumab (RESYNIV®).

Versión 4.0 fechado Sep 2026

Si tiene conocimiento o experimenta una sospecha de reacción adversa a su medicamento pue comunicarlos directamente al Centro Nacional de Farmacovigilancia, Ministerio de Salud de Pa través de Vigimedic Panamá Enlace: <https://vigiflow-eforms.who-umc.org/pa/vigimedic>

Si tiene conocimiento o experimenta una sospecha de falla terapéutica se notificarán a través d plataforma FADDI en el siguiente enlace: faddi-minsa.panamadigital.gob.pa

Si su médico le ha recomendado que reciba denosumab (RESYNIV®), que se utiliza para tratar la osteoporosis y la pérdida de hueso. Estas enfermedades implican el adelgazamiento y debilitamiento de los huesos, lo que facilita su fractura.

En raras ocasiones (puede afectar hasta a 1 de cada 1000 personas) en pacientes que reciben denosumab (RESYNIV®) para tratar la osteoporosis, se ha notificado un efecto secundario llamado osteonecrosis de la mandíbula (ONM) (daño óseo en la mandíbula). La ONM también puede aparecer tras suspender el tratamiento.

Es importante tratar de prevenir la aparición de ONM, ya que puede ser una infección dolorosa y que puede ser difícil de tratar.

Para reducir el riesgo de desarrollar ONM, debe tomar algunas precauciones.

ANTES DE INICIAR EL TRATAMIENTO:

Informe a su médico o enfermero (profesional de la salud) si tiene algún problema bucal o dental.

Su médico podría solicitarle un examen dental si:

- ha recibido tratamiento previo con otro medicamento, un bifosfonato.
- está tomando medicamentos llamados corticosteroides (como prednisolona o dexametasona).

- es fumador
- tiene cáncer
- no se ha hecho una revisión dental durante mucho tiempo
- tiene problemas en la boca o los dientes

MIENTRAS ESTÁ EN TRATAMIENTO:

- Debe mantener una buena higiene bucal y asistir a revisiones dentales periódicas. Si usa dentadura postiza, asegúrese de que le quede bien.
- Si está en tratamiento dental o se va a someter a una cirugía dental (por ejemplo, extracciones dentales), informe a su

médico e informe a su dentista si está en tratamiento con denosumab (RESYNIV®).

- Contacte a su médico y dentista inmediatamente si experimenta cualquier problema en la boca, como dientes flojos, inflamación, o llagas que no cicatricen o supuración, ya que estos pueden ser signos de osteonecrosis de la mandíbula.

Lea el prospecto que acompaña al medicamento para obtener más información.