

Si experimenta algún efecto secundario, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero.

Esto incluye cualquier posible efecto secundario que no se describa en este prospecto.

POR FAVOR REPORTE EFECTOS SECUNDARIOS A:

Abbott Centroamérica y Caribe (pv.guatemala@abbott.com)

O REPORTE A:

Centro Nacional de Farmacovigilancia, Ministerio de Salud de Panamá a través de Vigimedic Panamá Enlace: <https://vigiflow-eforms.who-umc.org/pa/vigimedic>

Al reportar los efectos secundarios, puede ayudar a proporcionar más información sobre la seguridad de denosumab (DNOCLAST®).



Esta tarjeta recordatoria contiene información de seguridad importante que debe tener en cuenta antes y durante el tratamiento con denosumab (DNOCLAST®) inyecciones para afecciones relacionadas con el cáncer.

Versión 4.0 fechado Sep 2026

Su médico le ha recomendado que reciba inyecciones de denosumab (DNOCLAST®) para ayudar a prevenir complicaciones óseas (p. ej., fracturas) causadas por metástasis óseas o cáncer de hueso.

Se ha notificado con frecuencia un efecto secundario llamado osteonecrosis mandibular (ONM, daño óseo en la mandíbula) (que puede afectar hasta a 1 de cada 10 personas) en pacientes que reciben inyecciones de denosumab (DNOCLAST™) para afecciones relacionadas con el cáncer. La ONM también puede aparecer después de suspender el tratamiento.

Es importante intentar prevenir el desarrollo de la ONM, ya que puede ser una afección dolorosa

que puede ser difícil de tratar. Para reducir el riesgo de desarrollar ONM, se deben tomar algunas precauciones:

ANTES DE INICIAR EL TRATAMIENTO:

- Consulte con su médico si se recomienda un examen dental antes de comenzar el tratamiento con denosumab (DNOCLAST®).
- Informe a su médico/enfermera (profesional de la salud) si tiene algún problema en la boca o los dientes. Pacientes que se sometan a cirugía dental (p. ej., extracciones dentales), que no reciben atención dental rutinaria o que tienen

enfermedad de las encías, fumadores, personas mayores y que reciben diferentes tipos de tratamientos contra el cáncer pueden tener un mayor riesgo de desarrollar osteonecrosis mandibular (ONM).

DURANTE EL TRATAMIENTO:

- Debe mantener una buena higiene bucal y realizarse revisiones dentales periódicas. Si usa dentadura postiza, asegúrese de que le quede bien.
- Si está en tratamiento dental o se va a someter a una cirugía dental (por ejemplo, extracciones dentales), informe a su médico y dígame a su dentista que está en tratamiento con denosumab (DNOCLAST®).

- Comuníquese con su médico y dentista inmediatamente si experimenta cualquier problema con su boca o dientes, como dientes flojos, dolor o hinchazón, llagas que no cicatrizan o secreción, ya que estos podrían ser signos de ONM.

Lea el prospecto que viene con el medicamento para obtener más información.

*Si tiene conocimiento o experimenta una sospecha de reacción adversa a su medicamento puede comunicarlos directamente al Centro Nacional de Farmacovigilancia, Ministerio de Salud de Panamá a través de Vigimedic Panamá
Enlace: <https://vigiflow-eforms.who-umc.org/pa/vigimedic>*

Si tiene conocimiento o experimenta una sospecha de falla terapéutica se notificarán a través de la plataforma FADDI en el siguiente enlace: faddi-minsa.panamadigital.gob.pa